

# Accueil d'un patient diabétique au comptoir

## Avec prescription de lecteur de glycémie sans nom de marque



### Quel est le besoin du patient?

#### Savoir quand agir

► Conseillez-lui



#### Savoir comment progresser

► Conseillez-lui



\* Avec fonction Coach de Glycémie

## Avec prescription de bandelettes réactives



### Depuis combien de temps votre patient est-il équipé de son lecteur de glycémie?

#### Depuis plus de 4 ans

- Son lecteur de glycémie peut être vieillissant, il est désormais éligible à un renouvellement\* par son médecin. Conseillez-lui le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select® Plus selon son besoin.
- Vérifiez qu'il connaît ses objectifs glycémiques et qu'il respecte la fréquence de tests à réaliser selon la prescription de son médecin.

#### Depuis moins de 4 ans

- Vérifiez qu'il connaît ses objectifs glycémiques et qu'il respecte la fréquence de tests à réaliser selon la prescription de son médecin.

Le patient doit consulter son médecin avant d'effectuer tout changement significatif dans son traitement. Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs fixés par le médecin afin de définir l'affichage du code couleur (ColourSure® et ColourSure® Plus).

03/2020. Les lecteurs de glycémie OneTouch Select® Plus et OneTouch Verio Reflect® sont des dispositifs d'AutoSurveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. DMDIV Liste B. Organisme notifié: DEKRA (CE 0344). Les bandelettes réactives OneTouch Verio® sont compatibles avec les lecteurs de glycémie OneTouch Verio Reflect®. Les bandelettes réactives OneTouch Select® Plus sont compatibles avec les lecteurs de glycémie OneTouch Select® Plus. L'ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée à l'ensemble des personnes atteintes de diabète; ni une mesure passive, n'entraînant pas de conséquence thérapeutique immédiate. Lire attentivement la notice. Ne pas utiliser pour diagnostiquer ou dépister le diabète, ou chez les nouveau-nés. Ne pas utiliser en présence établie ou présumée de PAM (Pralidoxime). OneTouch Verio Reflect® ne doit pas être utilisé chez les patients ayant fait un test d'absorption au D-xylose dans les 24 heures précédentes. \*Ces dispositifs sont remboursés au titre de la LPP dans les limites suivantes: - Lecteur (Adulte: 1 par 4 ans. Enfant: 2 par 4 ans) - Autopiqueur (Adulte: 1 par an. Enfant: 2 par an) - Bandelettes (200 par an pour DT2 non insulino-dépendant).

LifeScan Europe, GmbH (Zug - Suisse).

© 2020 LifeScan IP Holdings, LLC - FR-POR-2000015 - Document réservé aux professionnels de santé.

LifeScan France SAS - 57-59 Rue Yves Kermen - 92100 Boulogne-Billancourt - S.A.S. au capital de 11 500 001 € - 839 988 920 R.C.S. Nanterre.

**ONETOUCH**  
à vos côtés pour avancer™